

# チンゲンサイ

抗発ガン作用や免疫賦活作用で知られているβカロテンが豊富に含まれているチンゲンサイは、柔らかくて歯ごたえが良く、煮崩れしにくいので、炒めものや煮込み料理に向いています。

# 10月の農作業

**作型** 涼くなってから播種する秋まきは作りやすい。11月～3月まきはトンネル、ハウスが必要。播種時期をずらし、長期間収穫するとよい。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品 種 名
ハウス・トンネル	○	■	■	○	■					○	■	■	上海、武帝、青美 (11月～3月まきは、 トンネル・ハウス栽培)
	○：種まき ■：収穫												


## 畑の準備・定植

<b>土づくり a当たり</b>	
堆肥	300kg
セルカ(有機石灰)	10kg
7～10日前に施用し土と混合	
<b>元肥 a当たり</b>	
醗酵鶏糞	30kg
畝立時施用	

- ・畝幅100～120cm
- ・畝高 ・露地、トンネル30～40cm  
・ハウス10～20cm

## 定植

- ・黒マルチをし、保温、雑草防止、生育促進をはかる。
- ・株間15cm
- ・条間15cm(4条植)
- ・植え付け後は、十分灌水する。




## 防除

病害虫名	耕種防除	薬剤防除
アブラムシ類	光反射テープを畝上に張る 施設では開口部に寒冷紗を張る	モスピラン水溶剤(4,000倍) 7日前1回
コナガ	寒冷紗等被覆素材を用いる 早期発見し、除去する	アフーム乳剤(2,000倍) 3日前3回

## 播種・育苗

- ・セルトレイ(72穴) 本葉3～4枚で定植
- ・セルトレイ(128穴) 本葉2枚頃に定植
- ・軽く覆土し発芽するまで乾燥しないように灌水する。



## 収穫

- ・草丈15～20cm
- ・植え付け後30日前後で収穫となる。
- ・取り遅れないようにする。



# 生産日誌(記入例)

農産物直売所「食彩館 伊和の里」及びAコープ産直コーナーに、農産物を出荷される場合は、生産日誌を記入して必ず提出してください。  
※農薬ラベルの適用害虫・使用方法をよく読んで確認し、適正な使用を!!

# 10月の農作業

平成	生産者	農協 太郎	年産	品目名	キャベツ	提出日	26年 10月 20日
	住所	尖栗市一宮町東市場 429-1		品名	四季取甘藍		1宮町東市場 440-7
年産	連絡先	0790-72-1234	栽培	栽培場所	所在地	出荷終了予定日	11月 30日
	管理作業	7月 10日		定植日	8月 12日		出荷開始日
防除作業	施肥作業	肥料名	ネオコンボ	施用量	200 kg	施用日	9/25
			発酵鶏糞	100 kg			
			野菜専用化成	30 kg	追肥		
防除作業	用途	農薬の名称	アトマイヤー1粒剤	希釈倍数/使用量(注1)	1株当たり0.5g	使用回数	1回目
			ダコニール1000	1,000倍	30g	2回目	3回目
<b>記入例</b>							
<p>生産日誌は出荷開始日の5日前までに提出して下さい。 出荷日当日の生産日誌提出ではラベル発行ができませんので ご注意ください。</p>							