

サツマイモ



サツマイモに含まれるビタミンCは、でんぷんに守られて加熱しても壊れにくいそうです。豊富に含まれているカリウムは、塩分を排泄し高血圧に効果があります。

作型

気温が十分上がってから植え付ける。マルチ栽培すると生育を促し、早く収穫（9月から）できる。排水の悪いところへの作付けは避ける。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品 種 名
マルチ栽培					△	△	—	—	■	■	■	■	鳴門金時・紅はるか

△：植え付け ■：収穫

畑の準備・定植

土づくり a当たり	
堆肥	100kg
セルカ（有機石灰）	10kg
植え付け1ヶ月前に土と良く混合	
元肥 a当たり	
油粕	5~7kg
BMようりん	4kg
畝立時施用	

■ 苗の準備

開いた葉が5枚以上（重さ15g以上）
苗とり直後の植え付けは、強い日差しや風で弱ってしまうので注意する

- 1条植え：畝幅70~80m
株間：30~40cm
(植え付け時は葉は埋めない)
- 雑草防止に黒マルチを利用しても良い



悪い苗
徒長したり、節間が極端に短いものは
良いもが見つからない

良い苗
節間がやや詰まり、
充実している苗が良い

中耕・土寄せ

- 6月中下旬頃に畝間を軽く株元に土寄せする。(いもの肥大に効果がある)

〈苗の植え方〉



〈水平植え〉
いもの数…多い
肥 大…遅い



〈斜め植え〉
いもの数…やや多い
肥 大…早い



〈直立ざし〉
いもの数…最も少ない
肥 大…最も早い

防除

病害虫名	耕種的防除
コガネムシ類	未熟有機物の施用は避ける
イモコガ アブラムシ類	ふ化直後の幼虫を除去する

※薬剤防除に関しては、一宮営農経済センターにご相談ください。

収穫

- 4~5日晴天が続いた日を選んで、いもに傷がつかないように掘り取る。

貯蔵

- 温度13℃、湿度80~90%が理想の条件である。
- 部屋の中で貯蔵する場合は、モミガラを入れた発泡スチロール箱などに入れ、ふたには空気穴を開けておく。モミガラがない場合は一つひとつ新聞紙にくるんで入れる。

えだまめ



枝豆とは未成熟な大豆を収穫したものです。枝付きのまま扱われることが多かったために「枝豆」と呼ばれるようになったとも言われています。タンパク質が多く含まれることから畑の肉といわれる大豆。同じ植物である枝豆も、タンパク質や脂質を多く含んでいます。

作型

窒素過多になると、茎葉が繁茂し、着莢不良を招く。マルチをすると、さやの汚れを防ぎ商品性が向上し、また土壤の乾燥を防ぐことができる。根が浅いので、土壤表面の乾燥を防ぐため、マルチ、敷きわらをする。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品 種 名
直まき				○	○		■	■	■				えぞみどり・白毛グリーン75
							○	○		■	■	■	丹波黒

○：種まき ■：収穫

畑の準備・定植

土づくり a当たり

堆肥 300kg
セルカ（有機石灰） 15kg
BMようりん 5～7kg
植え付け1ヶ月前に土と良く混合

- 畝幅120cm 2条まき 株間20cm
(条間50～60cm)
(丹波黒は株間40cmの1条まきとする)

間引き・土寄せ・追肥

- 本葉の出始め：間引いて2本立ちとする。
- 播種後1ヶ月：土寄せを行う。
- 開花盛期：野菜専用肥料1.0～1.5kg/aを施用後、土寄せを行う。

灌水

- 開花までは控えめに、開花後は多めに灌水する。

防除

病害虫名	耕種防除	薬剤防除
カメムシ	幼虫の分散前に幼虫を取り除く	スターフル顆粒水溶剤(2,000倍) 7日前まで2回 (カメムシの散布期はさやの伸長期)
ハスモンヨトウ		トレボン乳剤(1,000～2,000倍) 14日前まで2回

収穫


- さやがふくらんで、指で押さえると、中の豆が飛び出すようになれば収穫適期。
(収穫が遅れると豆が硬くなる)




播種

- 播種は1ヶ所、2～3粒まき
(重ならないように)

〈ポリ鉢の育苗〉



〈直まきの場合〉



〈鳥害の防止〉

種まき後に寒冷紗をべた掛けするか、欠株対策として、育苗しておく。
(初生葉が半開きの苗を植え付ける)

※丹波黒大豆の栽培につきましては営農経済センターにご相談ください